

¿Quieres
todos los
nutrientes
en una
bebida?..



¡EXISTEN MEJORES OPCIONES!



Enterex[®]
Diabetic

¡La nutrición nunca
fue tan deliciosa!

Nutrición Completa y Balanceada.
Sin azúcar • Sin sacarina • Sin aspartame



Enterex® Diabetic

Enterex® Diabetic
Emulsión
Formula polimérica restringida
en hidrato de carbono para adultos
Para diabéticos

FORMULA: Con Fibra

Cada envase contiene:

Maltodextrina 26.700 g; Caseinato de sodio 10.070 g; Caseinato de calcio 1.830 g; Fibra de soya 3.370 g; Lecitina 0.170 g; Carragenina 27.550 mg; L - Carnitina 34.000 mg; Taurina 25.00 mg; M-Inositol 200.000 mg; Cloruro de colina 133.400 mg; Cloruro de magnesio 50.050 mg; Fosfato dibásico de magnésico 26.220 mg; Fosfato tricálcico 250.000 mg; Vitamina A 1,500.000 U.I.; Vitamina C 60.000 mg; Vitamina D3 100.000 U.I.; Vitamina E 18.000 U.I.; Vitamina K1 20.000 mcg; Clorhidrato de tiamina 0.380 mg; Riboflavina 0.420 mg; Niacinamina 5.000 mg; Clorhidrato de piridoxina 0.500 mg; Acido fólico 100.000 mcg; Vitamina B12 1.500 mcg; Biotina 1% 0.080 mg; Pantotenato de calcio 2.500 mg; Sulfato ferroso 8.580 mg; Yoduro de potasio 37.160 mg; Citrato trisódico 210.000 mg; Sulfato de zinc 3.730 mg; Selenita de sodio 17.500 mcg; Sulfato cúprico 500 mcg; Sulfato de manganeso 1.000 mg; Cloruro de cromo 50.000 mcg; Molibdato de sodio 37.880 mcg; Cloruro de potasio 370.000 mg; Citrato de potasio monobásico 78.630 mg; Fosfato de potasio dibásico 250.00 mg; Vehículo cbp 237 ml

Cada envase proporciona: 237 Kcal.

Yodo 28.4 mcg; Selenio 8 mcg; Cobre 199 mcg; Manganeso 325 mcg; Cromo 9.8 mcg; Molibdeno 16.2 mcg; Potasio 340.2 mcg; Hierro 3.1 mg; Sulfatos 8.1 mg; Sodio 56.2 mg; Citratos 199 mg; Zinc 1.5 mg; Cloro 208.4 mg; Magnesio 16.8 mg; Fosfatos 307 mg; Calcio 96.8 mg

INDICACIONES TERAPEUTICAS: Enterex® Diabetic se indica en las siguientes condiciones:

- 1.- Pacientes diabéticos tipo 1 y 2 (como merienda y/o como parte de una dieta balanceada);
- 2.- Pacientes en estrés metabólico con intolerancia a la glucosa.
- 3.- Personas que requieran un control de la glucosa.

Enterex® Diabetic puede ser utilizado como un suplemento nutricional o

como una nutrición completa según sean los requerimientos del paciente diabético en base a una dieta de 1000 a 2000 kcal por día, el paciente puede consumir de 4 a 8 latas.

CONTRAINDICACIONES Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. En pacientes diabéticos con un control inadecuado de los niveles de glucosa sérica o régimen calórico inadecuado.

PRECAUCIONES GENERALES No se recomienda utilizarlo en lugar de los alimentos naturales

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Enterex® Diabetic es una fórmula de uso para pacientes diabéticos, aunque no se han reportado efectos colaterales en mujeres embarazadas, ni en periodo de lactancia con el uso de Enterex® Diabetic se debe de tomar en cuenta que los componentes de la fórmula, atraviesan la barrera placentaria y aparecen en la leche materna, por lo que el medico tratante evaluara los riesgos y beneficios para la madre y el producto.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: No se han reportado reacciones secundarias cuando se usa Enterex® Diabetic a las dosis recomendadas. Más sin embargo el efecto colateral más común de las dietas líquidas es la diarrea, se puede llegar a presentar náuseas, vómito, dolor y distensión abdominal con el uso indiscriminado de Enterex® Diabetic.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GENERO: No se han reportado interacciones medicamentosas, ni de otra índole con el uso de Enterex® Diabetic y algún otro medicamento.

PRECAUCIONES EN RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: No se han reportado efectos de carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis o sobre la fertilidad con el uso de Enterex® Diabetic.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: Su vía de administración es oral o por sonda. Se sugieren de 4 a 8 latas por día usado como complemento. Su sabor mejora cuando se ingiere frío.

Administración por sonda: Enterex® Diabetic puede administrarse a través de sonda nasogástrica y nasointestinal, se debe de administrar a la

temperatura ambiente. Para alimentación por gravedad use una sonda de silicona con diámetro de 8F.

No debe ser inyectado. Agítese antes de usarse. Fórmula diseñada para las necesidades dietéticas de personas con diabetes con un control adecuado de los niveles de glucosa sérica o régimen calórico adecuado. No contiene azúcar.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACION O INGESTA ACCIDENTAL: No se han reportado casos de sobredosis.

PRESENTACION: Lata con 237 ml, con sabor vainilla o chocolate.

LEYENDAS DE PROTECCION: Una vez abierto el envase, consúmase de inmediato y deséchese el sobrante. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para el médico. El uso de Enterex® Diabetic por más de un mes requiere de una re-evaluación nutricia. El uso de este producto como única o principal fuente de nutrimentos debe ser evaluado por el profesional de la salud que lo prescriba.

Hecho en EUA por:

VICTUS Inc
4918 Southwest 74th Court
Miami, Florida USA 33155

Acondicionado y distribuido en México por:

Laboratorios PiSA, S.A. de C.V.
Calle 7 No.1308, Zona Industrial
44940 Guadalajara; Jal., México.

Reg. No. 238M2001 SSA V
IPP-R: DEAR-03361200029/5 RM 2003

Una información para prescribir más amplia puede ser solicitada al representante médico o directamente al laboratorio.

® Marca Registrada

Reg. No. SSA	Clave IPP-R	Aviso SSA
238M2001	DEAR-03361200029/5RM2003	04310104848/2004



¡Todos los nutrientes en una bebida!

¡La nutrición nunca fue tan deliciosa!

